

РЕЗУЛЬТАТЫ

Всероссийского анкетирования врачей в рамках проекта



сентябрь 2020


scardio.ru

1. Согласно Европейским рекомендациям по ведению пациентов с АГ от 2018 года рекомендуется достигать целевого уровня менее 130/80 мм рт. ст. у большинства пациентов. Williams B, Mancia G, Spiering W et.al. ESC Scientific Document Group; 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension, European Heart Journal 2018; 39 (33): 3021–104.

Информация предназначена для специалистов здравоохранения Представительство АО «Санофи-Авентис групп».
125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 22. Тел.: (495) 721-14-00, факс: (495) 721-14-11. www.sanofi.ru

Отметьте, пожалуйста, Вашу специальность в настоящее время по основному месту работы

- Терапевты
- Кардиологи
- Другие




540
ОТВЕТОВ

ЦЕЛЕВОЙ АДРЕС

< 130/80¹

1. Какое АД чаще выявляется у Вашего типичного пациента с Артериальной Гипертензией на момент постановки диагноза?




ЦЕЛЕВОЙ АДРЕС

< 130/80¹

АД – артериальное давление

По данным опроса специалистов здравоохранения в рамках проекта «Целевой Адрес». Ссылка: https://docsfera.ru/upload/pptx/goal_address_questionnaire_results_2020.pptx Дата последнего доступа: 15.10.2020

2. Кому из перечисленных ниже пациентов Вы бы назначили комбинированную АГ-терапию уже на первом этапе лечения?




ЦЕЛЕВОЙ АДРЕС

< 130/80¹

АГ – артериальная гипертензия, ССО – сердечно-сосудистые осложнения.

По данным опроса специалистов здравоохранения в рамках проекта «Целевой Адрес». Ссылка: https://docsfera.ru/upload/pptx/goal_address_questionnaire_results_2020.pptx Дата последнего доступа: 15.10.2020

3. На ваш взгляд, каким пациентом с АГ целесообразней назначение комбинации с тиазидным диуретиком, нежели с антагонистом кальция?




ЦЕЛЕВОЙ АДРЕС

< 130/80¹

АГ – артериальная гипертензия, ИБС – ишемическая болезнь сердца, САД – систолическое артериальное давление.

По данным опроса специалистов здравоохранения в рамках проекта «Целевой Адрес». Ссылка: https://docsfera.ru/upload/pptx/goal_address_questionnaire_results_2020.pptx Дата последнего доступа: 15.10.2020

4. На ваш взгляд, каким пациентом с АГ целесообразней назначение комбинации с антагонистом кальция, нежели с тиазидным диуретиком?



ЦЕЛЕВОЙ АДРЕС


< 130/80¹

АГ – артериальная гипертензия, ИБС – ишемическая болезнь сердца, САД – систолическое артериальное давление.

По данным опроса специалистов здравоохранения в рамках проекта «Целевой Адрес». Ссылка: https://docsfera.ru/upload/pptx/goal_address_questionnaire_results_2020.pptx Дата последнего доступа: 15.10.2020

5. С каким утверждением об антигипертензивной терапии Вы согласны с большей степени?

- Я предпочитаю начинать терапию АГ препаратами из класса ингибитора ангиотензин-превращающего фермента (иАПФ и их комбинации)
- Я предпочитаю начинать терапию АГ препаратами из класса антагонистов рецепторов ангиотензина II (сартаны и их комбинации)
- У меня нет явных предпочтений между иАПФ и сартанами
- Я предпочитаю начинать терапию АГ препаратами из других классов (диуретики, бета-блокаторы, антагонисты кальция)
- Ничего из перечисленного



543
ответа

ЦЕЛЕВОЙ АДРЕС


< 130/80¹

АГ – артериальная гипертензия,
иАПФ - ингибиторы ангиотензин-
превращающего фермента,

По данным опроса специалистов здравоохранения в рамках проекта «Целевой Адрес». Ссылка:
https://docsfera.ru/upload/pptx/goal_address_questionnaire_results_2020.pptx Дата последнего доступа: 15.10.2020

6. Как Вы обычно поступаете в случае недостижения целевого АД на фоне монотерапии

- Сперва повышаю дозу до максимальной и/или кратность приема, а потом добавляю второй компонент
- Назначаю другой монопрепарат (другой класс или МНН) с повышением дозы
- Назначаю комбинированную терапию в разных таблетках (для удобства титрации и лучшего контроля АД в течение суток)
- Назначаю комбинированную терапию в разных таблетках; с переводом на фиксированную комбинацию после завершения титрации дозы
- Сразу назначаю фиксированную комбинацию



543
ответа


ЦЕЛЕВОЙ АДРЕС

< 130/80¹

АД – артериальное давление.


7. На ваш взгляд, как долго пациенты в среднем сохраняют приверженность статинотерапии?

- До 6 месяцев
- До года
- До 3 лет
- До 5 лет
- Более 5 лет
- Затрудняюсь ответить



543
ответа

8. В каких случаях Вы бы назначили комбинированную гиполипидемическую терапию (статины в сочетании с эзетимибом)?




543
ответа

ЦЕЛЕВОЙ АДРЕС
< 130/80¹

ХС ЛНП – холестерин липопротеидов низкой плотности,

По данным опроса специалистов здравоохранения в рамках проекта «Целевой Адрес». Ссылка: https://docsfera.ru/upload/pptx/goal_address_questionnaire_results_2020.pptx Дата последнего доступа: 15.10.2020

9. С какими нежелательными явлениями статинотерапии вы сталкивались в реальной практике хотя бы однажды?



ЦЕЛЕВОЙ АДРЕС


< 130/80¹

КФК — креатинфосфокиназа.

По данным опроса специалистов здравоохранения в рамках проекта «Целевой Адрес». Ссылка: https://docsfera.ru/upload/pptx/goal_address_questionnaire_results_2020.pptx Дата последнего доступа: 15.10.2020

10. Оцените доступность определения показателей липидного спектра в вашей практике?

- Для широкого назначения доступен только общий холестерин (ОХС)
- Определение других показателей липидного спектра (например, ХС ЛНП, ХС ЛПВ, триглицериды и др.) возможно в единичных случаях
- Определение других показателей липидного спектра (например, ХС ЛНП, ХС ЛПВ, триглицериды и др.) возможно, но для этого требуется отдельные согласования
- Каких-либо ограничений по определению показателей липидного спектра в моей практике нет
- Затрудняюсь ответить



543
ответа

ЦЕЛЕВОЙ АДРЕС

< 130/80¹

ХС ЛНП – холестерин липопротеидов низкой плотности, ХС ЛПВ – холестерин липопротеидов высокой плотности

По данным опроса специалистов здравоохранения в рамках проекта «Целевой Адрес». Ссылка: https://docsfera.ru/upload/pptx/goal_address_questionnaire_results_2020.pptx Дата последнего доступа: 15.10.2020